


IC95%: AND=(23,5-28,5); ARA=(20,3-32,9); AST=(16,9-30,4); BAL=(21,9-35,9); CAN=(22-32,2); CTA=(13,4-31,3); CYL=(18,6-27,5); CLM=(16,6-26,3); CAT=(24,8-30); VAL=(22,9-29,3); EXT=(24-38,9); GAL=(22,3-31); MAD=(22,3-27,6); MUR=(19,7-31,9); RIO=(8,5-34); NAV=(15,3-35,3); PVA=(20,5-30,3).

Figura 24. Prevalencia bruta de dolor crónico por Comunidad Autónoma de residencia.



IC95%: AND=(6,6-9,7); ARA=(2,7-10); AST=(5,4-15,2); BAL=(1,2-8); CAN=(3,3-8,9); CTA=(0,9-11,9); CYL=(5-10,9); CLM=(5,1-11,7); CAT=(5,9-9); VAL=(7,1-11,3); EXT=(0,5-6,9); GAL=(6,1-11,8); MAD=(5,5-8,7); MUR=(3,4-10,7); RIO=(2,4-20,4); NAV=(1,1-13,4); PVA=(5,1-11,4).

Figura 25. Prevalencia bruta de dolor continuo por Comunidad Autónoma de residencia.